



1. **O uso de âncoras no reparo aberto da luxação anterior recidivante do ombro/
The use of suture anchors in open repair of recurrent anterior shoulder
dislocation**

Autor(es): Lech, Osvandré; Pinto Júnior, Sérgio Correa; Severo, Antônio

Fonte: *Rev. bras. ortop*; 38(11/12): 654-666, nov.-dez. 2003. ilus, tab

 Artigo [LILACS ID: 360841] Idioma: Português

Foram avaliados 54 pacientes (54 ombros), com diagnóstico de instabilidade ântero-inferior do ombro devida a luxação recidivante, submetidos a tratamento cirúrgico da lesão de Bankart pela técnica de reparação aberta do lábio da glenóide com âncoras, com o objetivo de demonstrar a validade deste método terapêutico. As cirurgias foram realizadas entre março de 1995 e julho de 2000, e o seguimento médio foi de 50,2 meses. A média de idade dos pacientes era de 26,7 anos. A análise dos resultados cirúrgicos foi feita pelos critérios de Rowe, obtendo-se 87,1 por cento de resultados excelentes e bons e 12,9 por cento de regulares e ruins.(AU)

Assunto(s): [Estudo Comparativo](#) [Humanos](#) [Masculino](#) [Feminino](#) [Adolescente](#) [Adulto](#) [Meia-Idade](#) [Luxação do Ombro/terapia](#)