

[BVS](#) > [Pesquisa](#) > [id:"lil-359823"](#)

1. **O tratamento cirúrgico da síndrome de impacto idiopática no processo coracóide/ Surgical treatment of coracoid process idiopathic impingement syndrome**

Autor(es): Simoni, Michael; Lech, Osvandré

Fonte: *Rev. bras. ortop*; 39(1/2): 14-20, jan.-fev. 2004. ilus

Artigo [LILACS ID: 359823] Idioma: Português

A dor na região anterior do ombro pode ter inúmeras causas. Os autores relatam os casos de 10 pacientes (11 ombros) com dor nessa região causada por síndrome de impacto do processo coracóide de origem idiopática. Dor localizada sobre o processo coracóide, causada por atividades com o braço em flexão e rotação interna, era a principal queixa. A história e o exame clínico específico conduziram ao diagnóstico. Após um período de tratamento fisioterápico sem melhoras, foi realizado tratamento cirúrgico (aberto em sete e artroscópico em três pacientes) para coracoplastia pósterio-lateral, que evoluiu com resolução dos sintomas em todos. (AU)

Assunto(s): [Humanos](#) [Masculino](#) [Feminino](#) [Adulto](#) [Meia-Idade](#) [Ombro/cirurgia](#) [Procedimentos Cirúrgicos Operatórios](#) [Artropatias](#) [Ombro/radiografia](#) [Síndrome](#)